РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Спутник V (Гам-Ковид-Вак)

«ЭпиВакКорона»

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи



ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

Тип вакцины - профилактическая



Тип вакцины - профилактическая

Разработан на основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2



Разработан на основе пептидов фрагментов белка S вируса SARS-CoV-2

Вводится двукратно, с интервалом в 3 недели



Вводится двукратно, с интервалом в 2–3 недели

Иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации



Иммунитет формируется через 30 дней после второй вакцинации

Возможные побочные действия

в первые – вторые сутки после вакцинации

ОБЩИЕ

- ОЗНОБ
- КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
- ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
- СЛАБОСТЬ
- БОЛЬ В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ
- ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА
- ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ
- СЫПЬ
- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ


МЕСТНЫЕ

НА МЕСТЕ ИНЬЕКЦИИ:

- БОЛЕЗНЕННОСТЬ
- гиперемия
- ОТЕЧНОСТЬ



СИМПТОМЫ ПРОХОДЯТ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДНЕЙ



КТО ПОДЛЕЖИТ ВАКЦИНАЦИИ?

Граждане старше 18 лет

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09 декабря 2020 г. №1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. №125н» вакцинации против COVID-19 подлежат:

ПРИОРИТЕТ 1 УРОВНЯ

- МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
- РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
- СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
- РАБОТНИКИ МФЦ
- ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ЛИЦА С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ПРИОРИТЕТ 2 УРОВНЯ

- РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
- СОТРУДНИКИ
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В
 ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ
 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
- ВАХТОВЫЕ РАБОТНИКИ
- волонтеры
- военнослужащие
- РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПРИОРИТЕТ З УРОВНЯ

- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
- ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
- ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 Обязательно ли сдавать анализ ИФА на наличие антител к COVID-19 перед вакцинацией?

Ответ: - Иммунизацию против новой коронавирусной инфекции проводят без предварительного лабораторного обследования на наличие антител. Но если вы переболели новой коронавирусной инфекцией, то вакцинация проводится через 6 месяцев, так как у переболевших уже есть антитела

Вакцинация от COVID-19 платная или бесплатная?

Ответ: - вакцинация бесплатная

• Имеется ли в составе вакцины куриный белок?

Ответ: - в составе нет куриного белка

• Будет ли при выезде за рубеж эта прививка актуальной?

Ответ: - да будет

ВАКЦИНАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОГО, ТАК И КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА



СОЗДАНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВИРУСА

ЗАЩИТИТЬ УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

НОРМАЛИЗОВАТЬ НАГРУЗКУ НА СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!



ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ: ДЕЗИНФЕКЦИЯ У СЕБЯ ДОМА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43












РУЧКИ ШКАФОВ



СПИНКИ СТУЛЬЕВ, НЕ ОБИТЫЕ ТКАНЬЮ И МЯГКИМ ПОРИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ







ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ И ПРОЧИЕ ЖЕСТКИЕ ПОВЕРХНОСТИ



КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



СМЕСИТЕЛИ



РАКОВИНЫ



ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ, РАСЧЕСКИ И ПР.)



ТУАЛЕТ (УНИТАЗ, ВАННА, ДУШЕВАЯ КАБИНА, БИДЕ)